CQ 1. 心不全に対する包括的心臓リハビリテーションでは、性差を考慮すべきか?



CQ 2. 経力テーテル的大動脈弁留置術(transcatheter aortic valve implantation: TAVI)にお

いて, 性差を考慮すべきか?

| PubMed | Cochrane | 医中誌 | Embase | PsycINFO® | CINAHL | Others(|) |
|--------|----------|-----|--------|-----------|--------|---------|---|
| 336 | 197 | 30 | | | | | |





CQ 3. 従来設定されている ABI カットオフ値を用いる際に, 性差を考慮すべきか?





CQ 4. PAD に対する血行再建の適応において、性差を考慮すべきか?

CQ 5. DVT 患者の診断において、D-dimer のカットオフ値に性差を考慮すべきか?





CQ 6. 大動脈病変に対する EVAR の推奨度に性差はあるか?



CQ 7. 若年者の無症候性心房細動へのアブレーション治療は、積極的に推奨されるか?

| PubMed | Cochrane | 医中誌 | | CINAHL | Others(|) |
|--------|----------|-----|--|--------|---------|---|
| 541 | 40 | 41 | | | | |



CQ 8. 慢性高血圧の妊娠中患者において,降圧治療を開始すべき血圧値はいくつか?



| (n= 27 |) |
|--------|---|
|--------|---|



CQ 9. 肺動脈性肺高血圧症の治療において、年齢を考慮すべきか?



CQ 10. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき身体的フレイルの評価指標は何か?

| PubMed | CENTRAL | 医中誌 | Embase | PsycINFO [®] | CINAHL | Others(|) |
|--------|---------|-----|--------|-----------------------|--------|---------|---|
| 331 | 83 | 484 | NA | NA | NA | NA | |

| Total records identified through | Additional records identified through |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| database searching $(n = 893)$ | other sources $(n = 0)$ |



CQ 11. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき精神・心理的フレイルの評価指標は何か?



CQ 12. 待機的腹部大動脈手術(血管内治療を含む)の適応や術式決定において、年齢を考慮す べきか?



CQ 13. 医療者側のどのような傾向が、心血管疾患患者の予後の改善や医療の質向上に貢献するか?



